



Clinique Vétérinaire du Lac 74320 SEVRIER

tel : 04 50 52 63 98 - fax : 04 50 52 49 73

info@veterinairedulac.fr

Dr NARDIN – Dr MAHINC – Dr BARBE

LA STÉRILISATION DE VOTRE CHATTE

La stérilisation de votre chatte peut se réaliser dès l'âge de **5-6 mois**. Elle consiste à lui enlever chirurgicalement les ovaires.

Pourquoi faire stériliser votre chatte ?

La stérilisation va permettre de **supprimer les chaleurs** et les désagréments liés à celles-ci :

- elle empêchera votre chatte d'avoir des petits.
- elle supprimera la recherche des mâles et limitera considérablement **les bagarres**. Les abcès consécutifs aux morsures et au coups de griffes seront donc beaucoup moins fréquents.
- la diminution des morsures et la suppression de la reproduction réduisent fortement le risque d'une contamination par **le virus de la Leucose féline ou du FIV (Sida du chat)**.
- la stérilisation diminue fortement le risque d'apparition de **tumeurs des mamelles** très souvent rencontrées chez les chattes non stérilisées (1 chatte non stérilisée sur 4 présente des tumeurs mammaires au cours de sa vie, et 80% de ces tumeurs sont malignes).

Quels sont les inconvénients de la stérilisation?

La stérilisation peut favoriser la prise de poids chez certains animaux. Afin d'éviter que votre chatte ne grossisse trop, nous vous conseillons de lui donner une **alimentation hypocalorique** adaptée à son état physiologique.

Avant l'opération

Vous pouvez prendre rendez-vous pour une ovariectomie 1 à 2 semaines avant la date souhaitée de l'intervention.

Si cela n'a pas déjà été réalisé auparavant, il est conseillé de profiter de la stérilisation pour effectuer l'**identification (tatouage ou puce électronique)** de votre animal : l'identification des animaux domestiques est obligatoire, et surtout elle permet de retrouver votre animal en cas de fugue ou s'il était accidenté et incapable de rentrer chez vous par ses propres moyens. Il est également conseillé de profiter de l'anesthésie pour réaliser un **test de dépistage du FeLV (leucose) et du FIV (« sida » du chat)**

La veille de l'intervention, retirez toute nourriture à partir de 22 heures. Vous pouvez laisser de l'eau comme boisson jusqu'au rendez-vous opératoire. Veillez à ce que votre chatte ne puisse sortir de la maison (afin d'être sûr qu'elle soit bien à jeun le matin de l'opération).

Déroulement de l'intervention

L'intervention de votre chatte se déroulera le matin à partir de 8 h 30. Avant l'intervention, le vétérinaire vérifie par un **examen pré-opératoire** que votre chatte est en bonne santé et que l'anesthésie ne présente pas de risque particulier. Une injection de produit anesthésique adaptée à son poids est ensuite réalisée en intra-musculaire. Lorsque votre chatte dort, elle reçoit une injection d'antibiotique puis elle est préparée pour l'intervention.

L'intervention consiste à ouvrir l'abdomen (laparotomie), à localiser les ovaires. Une ligature résorbable est alors posée sur les vaisseaux sanguins irriguant les ovaires, qui peuvent alors être sectionnés et retirés. La paroi abdominale est alors suturée avec un fils résorbable, puis c'est au tour de la peau d'être suturée à l'aide également d'un fils résorbable. Un pansement collé ou un pansement en spray cicatrisant, est alors mis pour protéger la plaie.

Après l'intervention, votre chatte est déposée dans un box de réveil et elle est surveillée par une assistante vétérinaire jusqu'à son réveil complet.

Soins post-opératoires

En fin d'après-midi, votre chatte est suffisamment réveillée pour que nous vous la rendions sans risque prévisible (étant entendu que tout signe suscitant une interrogation ou une inquiétude de votre part doit vous amener à prendre contact avec la Clinique).

A votre retour, installez la dans un endroit calme et chaud (20-22°C). Vous pouvez lui proposer de l'eau mais faites la boire par petites quantités. Et si elle vous réclame à manger ne lui donnez pas plus de la moitié de sa ration habituelle. Votre chatte doit avoir complètement récupéré en 24 à 48 heures.

Pendant la première semaine qui suit sa stérilisation, vous prendrez soins de ne pas la laisser sortir pour éviter toute tension sur les sutures. Si elle essaye de tirer sur les sutures, il est conseillé de venir chercher une collerette à la Clinique.

Un contrôle post-opératoire est prévu 3 semaines après la chirurgie. Si des fils de suture persistent encore, il seront retirés lors de ce contrôle.

Rendez-vous opératoire :

Rendez-vous post opératoire :

Alimentation conseillée après la stérilisation :